Guía de las Aves del Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan

SEO/Birdlife

Las 101 especies de Aves más frecuentes

Introducción

El Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan se declaró Reserva Natural en 1999. Lo componen las lagunas de La Veguilla, Camino de Villafranca y Las Yeguas. Situadas en las proximidades de la ciudad, tiene una extensión de 695 hectáreas de zona de protección, con un alto valor ecológico, lo que además ha propiciado la adopción de otras figuras de protección y reconocimiento: Refugio de Fauna, Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda (UNESCO), e incluidas como Zona Húmedas de importancia internacional dentro del Convenio RAMSAR.

Tiene su origen en los restos de antiguos cauces de ríos de época cuaternaria, posteriormente han quedado segmentados y cegados a trechos, siendo el único aporte para estas lagunas el agua de lluvia. Su ciclo natural dependerá de las condiciones meteorológicas anuales, presentándose por lo general secas en verano a diferencia de las otras estaciones.

Laguna de la Veguilla

La gran riqueza y diversidad de los componentes bióticos y abióticos de los humedales hacen que se encuentren entre los ecosistemas más complejos y productivos del planeta.

Laguna de las Yeguas

Poseen una gran variedad de biotopos y hábitats intermedios entre los ambientes terrestres y acuáticos, y juegan por tanto un papel importante en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico.

Laguna del Camino de Villafranca

Esta guía en nuestro bolsillo nos acercará al conocimiento del entorno que nos rodea y de las distintas formas de vida que guarda, concienciándonos de la singular función que desempeñan nuestras lagunas al ofrecer zonas de cría y descanso, condiciones necesarias para el establecimiento de aves tanto migratorias como residentes.

Desde aquí se pretende fomentar el respeto por parte de todos los que compartimos y disfrutamos la naturaleza, sintiéndonos un elemento más del ecosistema.

Las Aves del Complejo Lagunar

Las aves acuáticas constituyen uno de los componentes más carismáticos de la fauna que habita los humedales, realizando funciones como consumidores, aportadores de materia orgánica y modificadores del ambiente que los rodea.

La estructura de la vegetación es fundamental para las diversas especies de aves que nidifican en nuestras lagunas. Así por ejemplo, las zonas de pastizales inundables que las orillan, son utilizadas en época de cría por aquellas especies de aves que necesitan escasa cobertura vegetal, como fochas y gallinetas. En esta zona la vegetación reinante son diversas especies de almajos, y otros tipos de plantas perfectamente adaptadas a la escasez de agua y la alta salinidad.

Especies de mayor tamaño, como son los patos, requieren una mayor cobertura, que en nuestras lagunas viene dada por la vegetación palustre, consistente en ricas formaciones de carrizos, eneas y juncos, cuya zona superior es utilizada como lugar de alimentación por especies como los carriceros y bisbitas.

El estrato arbóreo en nuestras lagunas lo constituye el Taray, perfectamente adaptado a las condiciones cambiantes que marcan nuestras lagunas. Estos árboles son utilizados por gran multitud de aves como el mosquitero común y el alcaudón real. Por otro lado se hace necesario la existencia de aguas abiertas para el aterrizaje, la alimentación y el desplazamiento acuático de la avifauna, ya que permiten una mayor entrada de luz solar,

que facilita el desarrollo de la vegetación sumergida y de los invertebrados constituyentes de la dieta de las aves.

Uno de los factores claves que marca la presencia de las aves en un humedal es la disposición de alimento. Las técnicas de alimentación utilizadas por las diferentes especies van a dar lugar a una clasificación funcional de las aves, lo que posibilita una distribución espacial de los diversos grupos y facilita su reconocimiento.

Las aguas someras y extensas playas de limo formadas en los márgenes de las lagunas, sobretodo en la laguna del Camino de Villafranca y de Las Yeguas, favorecen la presencia de numerosas especies limícolas y aves zancudas, perfectamente adaptadas a la adquisición de alimento en estas zonas. Rasgos morfológicos característicos de estas familias son la longitud de sus patas y dedos largos en proporción al tamaño de su cuerpo como podremos observar en limícolas como cigüeñuela, avoceta y zarapito real o zancudas como garzas, cigüeñas y flamencos

En zonas húmedas de mayor profundidad donde las aves se zambullen o nadan para obtener el alimento, son las anátidas las que dominan. Concretamente las pertenecientes al grupo de los patos, que presentan picos anchos y aplanados y unas membranas interdigitales que les favorecen el nado. Podremos encontrarnos especies buceadoras que se zambullen para captar el alimento, como sería el caso del porrón europeo, y de superficie, que chapotean en el agua, adoptando una posición vertical, cabeza abajo para alimentarse del fondo, como el ánade real o patos filtradores que tienen la capacidad de filtrar el agua y el limo, reteniendo toda la materia vegetal comestible y los organismos vivos, ocurre así con la cerceta común.

Las aves que divisan el alimento en vuelo, tienen como protagonistas a la gaviota reidora y la pagaza piconegra, las cuales utilizan nuestros humedales como dormidero, zona de descanso y cría.

Vinculadas al ambiente lagunar encontramos especies que no están anatómica ni fisiológicamente adaptadas a la vida acuática, pero encuentran en los humedales una fuente de

recursos como alimento o lugares de nidificación.

Representantes de este hábitat serían aves como el aguilucho lagunero, curruca cabecinegra, cogujada, entre muchas otras. Formando parte del entorno nos encontramos con campos de cultivo y barbechos, hábitats para aves esteparias como el alcaraván.

Recomendaciones para la observación

Esta guía quiere acercarles al mundo de las aves facilitando la observación e identificación de las mismas, mediante ilustraciones, simbología y pequeños apuntes de su ecología. Del mismo modo, se aportan una serie de recomendaciones útiles para las salidas al campo:

- ☺ Imprescindible el uso de prismáticos (los más utilizados son de 8x30 ó 10x40 aumentos).
- ☺ Guía de bolsillo que permita un fácil manejo a la hora de reconocer las aves.
- ☺ Cuaderno de campo para anotar todo aquello que sirva de ayuda para una posterior identificación.
- ☺ Es necesario guardar silencio para no molestar a las aves.
- ☺ Los momentos ideales para la observación serán primera y última hora del día.
- ☺ Evitar el uso de ropa llamativa con el fin de no destacar en el paisaje.
- ☺ Utilizar los observatorios habilitados, para no alterar a la avifauna.
- ☺ No acercarse al carrizo en tiempo de cría por la presen cia de nidos.
- ☺ Recordar que estamos dentro de una Reserva Natural, lo que implica no coger muestras vegetales y por supuesto, no arrojar desperdicios.

Toponimia del Ave



Manejo de la Guía

En esta guía se ha hecho una selección de las aves que más comúnmente se ven en el Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan. Aunque al ser zona de descanso en el paso migratorio, existe la posibilidad de observar un mayor número de especie al descrito en la guía.

Se utilizan varias ilustraciones para distinguir el cambio de plumaje que presentan en invierno y en verano, o la diferencia existente entre ambos sexos.

♂ Macho ♀ Hembra ❄ Invierno ○ Verano

Acompañando a las ilustraciones se escribe un pequeño texto encabezado por el nombre vulgar y el científico, en el cual se aportarán datos sobre su ecología, morfología más llamativa y datos de singular interés para cada una de las especies.

El visitante puede identificar las especies que ha visto y/u oído marcando la casilla correspondiente.

Categorías Fenológicas

Residente

Especie en mayor o menor medida habitual a lo largo de todo el año, o lo ha sido dentro del periodo considerado. Pueden estar incluidas tanto especies o poblaciones sedentarias, como poblaciones estivales migradoras que son sustituidas después por otras poblaciones invernantes migradoras o en movimientos trashumantes.

Estival

Especie en mayor o menor medida habitual en primavera y verano, o lo ha sido dentro del periodo considerado. Normalmente en especies migradoras o trashumantes, por lo cual puede verse además en uno o los dos pasos migratorios.

Invernantes

Especie en mayor o menor medida habitual en otoño e invierno, o lo ha sido dentro del periodo considerado. Normalmente en especies migradoras o trashumantes, por lo cual puede verse además en uno o los dos pasos migratorios.

De paso

Especie en mayor o menor medida habitual en uno o los dos pasos migratorios, o lo ha sido dentro del periodo considerado. Paso prenupcial habitual: febrero-junio y paso postnupcial habitual: julio-diciembre.

Categoría Reproductora

R1, R2 **Reproducción posible:** especie vista en época adecuada en un hábitat de cría apropiado. Se han observado machos con cantos territoriales, cortejo, paradas nupciales, etc.

R3 **Reproducción segura:** se han observado nidos ocupados con ave incubando, cáscaras de huevos que puedan asignarse a una especie en concreto, jóvenes recién salidos del nido, etc.

Anotaciones

Podicipedidae - Somormujos

1. Zampullín común R3

Tachybaptus ruficollis

El más pequeño y regordete de los somormujos. Es el único que carece de adornos cefálicos. Ave buceadora muy tímida que se zambulle en seguida que se le sorprende. Construye el nido con vegetación palustre flotando sobre aguas tranquilas del humedal.

2. Somormujo lavanco

Podiceps cristatus

Es el somormujo más grande, esbelto y elegante. Inconfundible en época de reproducción por llamativo plumaje. Ave buceadora, bastante esquiva que se alimenta de insectos acuáticos y otros invertebrados. Suele permanecer la mayoría del tiempo al descubierto lejos de la vegetación.

3. Zampullín cuellinegro R3

Podiceps nigricollis

Pequeña ave de elegante silueta y cuello ligeramente erguido. Muy asustadiza, construye sus nidos escondidos entre el carrizo. Con frecuencia forma pequeñas colonias. Se alimenta de pequeños peces e invertebrados.

Ardeidae - Garzas y Avetoros

4. Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

Garceta pequeña relativamente rechoncha con el pico bastante corto. Durante el día se distribuyen por el campo en pequeños grupos o en solitario, concentrándose al anochecer en dormideros, normalmente árboles aunque a veces en arbustos o cañas.

5. Garza real

Ardea cinerea

Ave sociable, pero a menudo solitaria. Su gran tamaño y el plumaje grisáceo son distintivos. Sobre su cabeza destaca un penacho negruzco en individuos reproductores. En vuelo llevan el cuello recogido formando una curva. Anida en árboles o zonas de alta concentración de carrizo.

Ciconiidae - Cigüeñas

6. Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Ave zancuda muy grande, de patas, cuello y pico largos. Anidan tanto en solitario como formando colonias, sus nidos son enormes y desaseados. Forman bandadas durante las migraciones. Su vuelo es lento y pesado. Se alimentan en terrenos abiertos de pequeños reptiles y carroña.

Phoenicopteridae - Flamencos

7. Flamenco común R2

Phoenicopterus ruber

Filtradora de gran tamaño, de patas y cuellos muy largos. Destaca su enorme pico abultado, curvado de forma peculiar. En tierra muestran color blanquecino siendo en vuelo donde se aprecian su color rosa característico. Altamente gregarias, se presentan en agrupaciones muy numerosas en las lagunas.

Anatidae - Gansos, Cisnes y Patos

8. Ansar común

Anser anser

Ánsar grande y voluminoso, de cabeza y pico gruesos, muy ágil para su tamaño. Se comunican por medio de graznidos, cuya entonación y ritmos marcan significados diversos. Son aves muy gregarias permaneciendo unidos grupos familiares en las grandes migraciones.

9. Tarro blanco R3

Tadorna tadorna

Ave tanto terrestre como acuática, de aspecto rechoncho. Difícil de confundir con otras especies. En machos el pico, en su parte superior se extiende hacia la frente formando un chichón. Suele anidar en agujeros del suelo. Los pollos son agrupados en "guarderías" a cargo de algún adulto, mientras los demás viajan a territorios de muda.

10. Silbón Europeo

Anas penelope

Ave de apariencia compacta, recoge el cuello al posarse en el agua. Son muy gregarios desplazándose en bandos compactos. Sus alas estrechas producen un sonido característico al volar. El silbido penetrante de los machos es muy característico.

11. Ánade friso R1

Anas strepera

Pato nadador que forma pequeños grupos, mezclándose con otros patos. Se pueden localizar próximos al borde de la vegetación emergente. Busca aguas tranquilas con un refugio seguro entre la vegetación palustre. Se alimentan fundamentalmente de materia vegetal.



12. Cerceta común

Anas crecca

Pato nadador muy pequeño dotado de una gran habilidad para el vuelo realizando giros y cambios de sentido. Durante el día es una ave perezosa que descansa cerca de la vegetación. Los nidos son construidos cerca del agua, procurando que estén secos, bien escondidos.

13. Ánade azulón o real R3

Anas platyrhynchos

Pertenece al grupo de los patos nadadores. Es la especie más versátil capaz de adaptarse a cualquier ambiente. Los machos presentan un plumaje muy vistoso inconfundible. Es un ave muy social, para el reposo busca masas de agua, con frecuencia extensas para grupos o bandos.

14. Ánade rabudo R3

Anas acuta

Pato nadador de cueresbelto. Los machos presentan una larga cola puntiaguda que los hace inconfundibles. Se alimenta por la noche descansando durante el día en la laguna. Nidifican entre la vegetación. Son sociables pudiéndose ver formando bandos numerosos con otras especies.

15. Cuchara común R3

Anas clypeata

Pato nadador de pico largo y muy ancho en forma de pala. Forma grandes bandadas sobretodo en migración. Por el día descansa, desplazándose por la noche a los comederos habituales. Los nidos son construidos siempre en el suelo entre los juncos.

16. Cerceta pardilla R3

Marmaronetta angusttirostris

Pato pequeño y esbelto, con un comportamiento que recuerda a los pequeños patos nadadores con los cuales se entremezcla. Dato distintivo de la especie es la carencia de espejuelo. No suele formar grandes bandos. El nido es pequeño y presenta un pasillo de entrada.

17. Pato colorado R3

Netta rufina

Pato voluminoso de cabeza redondeada y pico rojo. Se comporta como nadador en condiciones favorables de alimentación pero cuando presentan menor accesibilidad son capaces de bucear. Nidos por lo general en suelos aunque los podemos ver flotantes en aguas poco profundas.

18. Porrón europeo R3

Aythya ferina

Pato buceador de cuerpo rechoncho y jorobado. Se mezclan liberalmente con los patos nadadores, pero se mantienen alejados de otras especies cuando duermen. Construyen sus nidos en zonas encharcadas cerca del carrizo. Son patos poco activos.

19. Malvasía cabeciblanca R3

Oxyura leucocephala

Especie reproductora de gran importancia catalogada "en peligro de extinción". Destaca el gran pico azul en machos y la cola tiesa a menudo vertical. Pato buceador poco sociable. Se alimenta de semillas y partes vegetativas de plantas acuáticas y larvas de insectos. Se observan en la laguna de la Veguilla.

Accipitridae - Buitres, Gavilanes y Águilas

20. Milano negro

Milvus migrans

Ave de alimentación omnívora que se adapta fácilmente a cualquier cambio en la naturaleza. Construye sus nidos en grandes árboles. Es bastante gregaria, reuniéndose en grupos cuando encuentra restos comestibles.

21. Aguilucho lagunero R3

Circus aeroginosus

Es el mayor de los aguiluchos. Su hábitat óptimo está asociado a la vegetación palustre de las lagunas, entre la cual construyen sus nidos. Tienen tendencia a la sociabilidad, agrupándose en dormideros en los carrizales de cinco a veinticinco individuos. Se alimenta de aves acuáticas, anfibios y reptiles.

22. Aguilucho pálido

Circus cyaneus

Grandes diferencias en el plumaje de hembras y machos. Destaca la zona ventral del mancho blanco puro. El nido lo construye la hembra entre los juncos. Se alimenta de aves terrestres y pequeños mamíferos. Presenta gran agresividad con las demás aves.

23. Aguilucho cenizo R3

Circus pygargus

Se diferencia del aguilucho pálido por la característica raya negra que cruza las plumas secundarias de las alas. En las migraciones se concentran en grupos numerosos. Se puede ver cazando volando a baja altura sobre el carrizo y los campos.

24. Cernícalo primilla R3

Falco naumanni

Sus garras blancas, visibles cuando se posa cerca, son características. Tiene su hábitat en campo abierto pero es común verlo en la torre de las iglesias. Ave colonial que se ha visto mermada en los últimos años adquiriendo la categoría de vulnerable. Se alimenta principalmente de insectos.

25. Cernícalo vulgar R3

Falco tinnunculus

Ave de presa diurna de las más comunes. Puede permanecer inmóvil en el aire con la cola y alas quietas. Vive en pareja o en solitario. Se adapta muy bien a distintos ambientes. Se alimenta de pequeños mamíferos y aves.

26. Esmerejón

Falco columbarius

Es el más pequeño de los halcones europeos. Poco más grande que un mirlo. Cuando caza su vuelo es rasante. Su dieta está constituida por pajarillos, pequeños mamíferos, lagartos e insectos. Suelen construir sus nidos en el suelo.

27. Alcotán

Falco subbuteo

Halcón de pequeño tamaño, de extraordinaria rapidez, muy hábil en vuelo durante el cual caza insectos, golondrinas y vencejos. Ave gregaria durante la migración. Construye sus nidos en terrenos abiertos sobre árboles dispersos.

Phasianidae - Faisanes y Perdices

28. Perdiz roja R3

Alectoris rufa

Una de nuestras aves más típicas. Se encuentra en campos de cultivo. Con frecuencia corre velozmente antes de iniciar un vuelo raudo y directo. Su identificación es facilitada por la banda negra desde el pico hasta el ojo prolongándose hacia atrás. Se alimenta de granos, insectos, flores, etc.

Rallidae - Rascones, Pollas de Agua y Fochas

29. Gallineta R3

Gallinula chloropus

Ave acuática difícil de ver por su carácter asustadizo. Suele ocultarse entre la vegetación palustre de las orillas, donde crían siempre en agua dulce, vista en La Veguilla. Es de un inconfundible negro pizarra y el escudete frontal rojo. Además de comer hierbas acuáticas es granívora e insectívora.

30. Calamón común R3

Porphyrio porphyrio

Su coloración es azul purpúrea en la que destacan el rojo vivo de pico y patas. Ave palustre, cuyas costumbres ariscas y discretas hacen que sea difícil observarla. Trepa y nada con facilidad y vuela relativamente bien. Su voz es característica por asemejarse a un trompetazo. Su alimentación es básicamente vegetal. Se localiza en La Veguilla.

31. Focha común R3

Fulica atra

Aves agresivas, con un sentido territorial altamente desarrollado y muy dadas a luchas entre ellas. Se reconocen fácilmente por el pico y un escudete frontal blancos, que contrastan con el negro del plumaje. Se encuentran sobre todo por zonas palustres.

Recurvirostridae - Cigüeñuelas y Avocetas

32. Cigüeñuela R3

Himantopus himantopus

Limícola inconfundible por sus largas patas rosadas. Su fino pico largo le sirve para obtener el alimento del fango. Ave colonial, típica de marismas y saladares. Si está quieta se mantiene en una sola pata, como la mayoría de los limícolos.

33. Avoceta R3

Recurvirostra avosetta

Limícola adaptada a las charcas salobres, con grandes patas palmeadas y pico curvo hacia arriba que lo mueve de un lado a otro removiendo las aguas fangosas y el limo para obtener su alimento. Anidan en colonias en general numerosas.

Burhinidae - Alcaravanes

34. Alcaraván común R3

Burhinus oedicnemus

Ave esteparia y crepuscular. Es inconfundible por sus grandes ojos amarillos, cabeza redonda y pico corto, su color es leonado claro rayado de castaño. Cría en tierra en terrenos despejados como cultivos marginales al Complejo Lagunar.

Charadriidae - Chorlitos

35. Chorlitejo chico R3

Charadrius dubius

Limícola de pequeño tamaño que se suele observar por las playas limosas de la laguna del Camino de Villafranca. Es una especie muy ruidosa en época de cría. Su alimentación principalmente son insectos, también arañas, pequeños moluscos y gusanos.

36. Chorlitejo grande

Charadrius hiaticula

Se diferencia del anterior por su mayor tamaño y, en vuelo, por la visible franja alar. Habita en playas arenosas. Se alimenta de alguna materia vegetal y de invertebrados del fango.

37. Chorlitejo patinegro R3

Charadrius alexandrinus

Chorlito de pequeño tamaño. Su plumaje en el dorso es más pálido que el que presentan los anteriores, además del pico y las patas que son negruzcos, y de que carece de la mancha negra que poseen en el pecho quedando sólo dos pequeñas motas negras a ambos lados del cuello. Su cabeza es ligeramente rojiza.

38. Avefría europea R3

Vanellus vanellus

Su apariencia es inconfundible por la larga y eréctil cresta que le nace en la oscura cabeza. Típica de herbazales y las tierras de cultivo húmedas donde, en invierno, forma grandes bandadas. Su vuelo es con frecuencia altamente acrobático.

Scolopacidae - Correlimos

39. Correlimos menudo

Calidris minuta

La más pequeña de nuestras limícolas. Ave solitaria, suele ser muy sociable durante el paso migratorio asociándose con otras limícolas. Se alimenta picando la superficie del lodo, vadeando por aguas someras. Se observa en la laguna del Camino de Villafranca.

40. Correlimos común

Calidris alpina

Limícola muy sociable. Camina bastante rápido mientras se alimenta sondeando la superficie del limo. En vuelo presenta una franja blanca a lo largo del centro del ala. Las grandes bandadas realizan espectaculares giros y cambios de dirección en vuelo.

41. Combatiente

Philomachus pugnax

Limícola poco común y peculiar. En verano los machos adquieren un plumaje espectacular que coincide con su época reproductora, en la cual adquieren un comportamiento violento de luchas entre machos.

42. Aguja colinegra

Limosa limosa

Limícola de gran tamaño de pico recto y largo. Ave silenciosa pudiéndose escuchar solo en los lugares de reproducción. Sociable excepto cuando cría. Forma bandadas en las playas de limo donde sondean el agua somera con el largo pico.

43. Zarapito real

Numenius arquata

Limícola de gran tamaño que presenta un característico pico largo curvo hacia abajo. Se alimenta en solitario bien sondeando el lodo en profundidad o cogiendo el alimento en la superficie. Su hábitat predilecto son las playas de limo, pudiéndose observar en la laguna de las Yeguas.

44. Archibebe común

Tringa totanus

Limícola de carácter tímido y solitario. Suele observarse en las lagunas salinas en compañía de otros limícolas. El nido lo construyen oculto en el suelo. Su dieta está constituida por pequeños invertebrados que encuentran en la superficie del agua o clavando su pico en el limo.

45. Archibebe fino

Tringa stagnatilis

Limícola de aspecto delicado y pico fino, en forma de aguja. Se asocia fácilmente con otras limícolas aunque suele alimentarse en solitario en grupos dispersos. Sacude la cabeza cuando se asusta como las demás especies de su género.

46. Andarríos grande

Tringa ochropus

Limícola poco sociable, recorre en solitario los márgenes de la laguna. Solo forma bandos durante la migración pero estos no son muy numerosos. Vuelo rápido que a veces efectúa a gran altura sobre la laguna.



47. Andarríos chico

Actitis hypoleucos

Pequeña limícola solitaria reconocible por el contoneo nervioso de la cola cuando camina o se encuentra en posición erguida. Cuando se asusta sacude la cabeza y corre en cortos estallidos. Vuelan bajo sobre el agua en semicírculos, alternando batidos de alas con momentáneos planeos.

Laridae - Gaviotas

48. Gaviota reidora R3

Larus ridibundus

Gaviota de pequeño tamaño caracterizada por el color negro de su cabeza que solo presenta en época estival. Es muy ruidosa, su voz nos recuerda a una risa. Anida en colonias numerosas en la laguna de las Yeguas.

49. Gaviota sombría

Larus fuscus

Ave sociable se alimenta principalmente de carroña y basura. Anidan en colonias en el suelo, fácilmente observables en la laguna del Camino de Villafranca.

Sternidae - Charranes y Fumareles

50. Pagaza piconegra R3

Gelochelidom nilotica

Se encuentra protegida bajo la categoría de vulnerable. Ave de costumbres poco acuáticas. Anidan en colonias y con frecuencia se desplazan juntas sobre las playas limosas salobres, corriendo para atrapar gusanos, insectos y batracios, o bien vuelan persiguiendo libélulas y mariposas.

51. Fumarel cariblanco R3

Chlidonias hibrida

Protegida como vulnerable. Ave pequeña y rechoncha de vuelo ágil. Es gregaria y se suele ser ver entre la vegetación palustre de La Veguilla, ya que es propio de agua dulce. Se alimenta de insectos en general, renacuajos y ranas pequeñas.

52. Fumarel común R3

Chlidonias niger

Al igual que los anteriores, está catalogada como vulnerable. En primavera, es fácil de reconocer por la cabeza y partes inferiores negras y partes superiores gris oscuro a diferencia del otoño que es más común. Se localiza en La Veguilla.

Columbidae - Palomas y Tórtolas

53. Paloma torcaz R3

Columba palumbus

Es la mayor y más corpulenta de las palomas europeas. Su identificación es facilitada por las características medialunas alares que presenta. Habitan por el entorno de la laguna y los campos que las rodean, alimentándose fundamentalmente de materia vegetal.

54. Tórtola turca R3

Streptopelia decaocto

Característico medio collar negro en adultos que la hace distinguible de las demás tórtolas. Ave gregaria fuera de la época de reproducción. Construye sus nidos en árboles. Su alimentación es granívora.

55. Tórtola europea R3

Streptopelia turtur

La más pequeña y grácil de las palomas. Prefiere campo abierto con pocos árboles. Forma bandos numerosos durante la migración. Se alimenta casi exclusivamente de semillas.

Cuculidae - Cucos

56. Críalo europeo R3

Clamator glandarius

Llaman la atención su cabeza crestada y su cola larga y graduada. Ave de campo abierto, parasitiza los nidos de las urracas. Se alimenta principalmente de insectos de gran tamaño. Los adultos viven generalmente en grupos.

57. Cuco común R2

Cuculus canorus

Ave inconfundible por su reclamo. Suele posarse en lo alto de los terrenos abiertos a menudo con las alas caídas y la cola abierta. Pone sus huevos en nidos ajenos. Se alimenta principalmente de insectos y sus larvas.

Tytonidae - Lechuzas

58. Lechuza común R3

Tyto alba

Ave de tamaño mediano, bastante distintiva por el disco facial acorazonado. Aunque se trate de una rapaz nocturna, es frecuente verla cazar tanto de noche como de día alimentándose de pequeños mamíferos, insectos, ranas e incluso murciélagos.

Apodidae - Vencejos

59. Vencejo común R3

Apus apus

Ave de costumbres áreas, llegando incluso a dormir en el aire aquellos que no tienen que incubar o cebar a sus pollos. Sus patas son tan débiles por el poco uso, que si caen al suelo son incapaces de remontar. Parece ser que se aparean para toda la vida.

Meropidae - Abejarucos

60. Abejaruco común R3

Merops apiaster

Ave de vistosa coloración. Hábil volador, caza insectos de gran tamaño como abejorros y libélulas. Cría en colonias construyendo sus nidos en el suelo en zonas cercanas al agua, a falta de taludes.

Coraciidae - Carracas

61. Carraca R3

Coracias garrulus

Su catalogación es como vulnerable. Llama la atención el color pálido azul turquesa que presenta en la cabeza y partes inferiores y el dorso de un canela rojizo. Es frecuente verla posada en los tendidos eléctricos próximos. Come grandes insectos, pequeños reptiles, batracios y mamíferos.

Upupidae - Abubillas

62. Abubilla R3

Upupa epops

Ave inconfundible por su cresta blanca y negra, y su gran pico curvo, con el que perfora la tierra en busca de gusanos y larvas. Casi siempre se las ve en parejas o solitarias, pero siempre guardando una distancia entre una y la otra. Anidan en huecos de árboles.

Alaudidae - Alondras

63. Calandria R2

Melanocorhypa calandra

Alondra de gran tamaño, sociable, en época de cría incluso colonial. Su hábitat es estepario. Cuando se asusta adopta una postura característica en cuclillas en vez de salir volando. Anida en el suelo casi siempre al abrigo de una planta.

64. Terrera común R2

Calandrella brachydactyla

Ave de pequeño tamaño que habita en terrenos abiertos de cultivo y pastizales. Nunca se posa en árboles y rara vez en arbusto. Anida en el suelo y su alimentación es a base de semillas y algún que otro insecto.

65. Cogujada común R3

Galerida cristata

Ave de ambientes áridos con poca cobertura vegetal. Prefiere caminar por el suelo, llevando extendida su llamativa cresta terminada en punta. Ave sedentaria que permanece durante todo el año en un mismo lugar.

66. Alondra común R2

Alauda arvensis

Ave esteparia de tamaño medio-grande con una corta cresta. Muy sociable, forma grandes bandadas durante la migración. Puede verse en compañía de otros alaúdidos, bisbitas y escribanos. Apenas visible en el suelo se alimenta en una postura acurrucada.

Hirundinidae - Golondrinas y Aviones

67. Golondrina común R3

Hirundo rustica

Caracteriza por su forma esbelta y cola ahorquillada. Tienen sus dormideros en los carrizales. El nido es de barro y pajas en forma de media taza, forrado con plumas. Se considera un ave muy inquieta. Su alimentación está basada básicamente en insectos que caza al vuelo.

68. Golondrina dáurica R3

Hirundo daurica

Se diferencia muy bien de la anterior por su parte inferior en gran parte pálido, en abrupto contraste con la punta de la cola negra y por un vuelo más pausado. Es mucho menos social, no viéndose en grandes agregaciones

69. Avión común **R3**

Delichon urbica

Su cola es corta y escotada. Bien adaptada al ambiente rural la vemos anidando en diferentes partes del Complejo Lagunar. Es muy ruidosa sobre todo cuando está en vuelo, el cual se parece mucho a la Golondrina con parecida agilidad, aunque carece de su rapidez.

Motacillidae - Bisbitas y Lavanderas

70. Bisbita campestre **R1**

Anthus campestris

Ave inquieta que corretea de un lado a otro con el cuerpo horizontal. Suele posarse al descubierto. Normalmente es un pájaro de costumbres solitarias. Prefiere terrenos secos y áridos. Se puede observar en el entorno lagunar alejada del agua.

71. Bisbita común

Anthus pratensis

Ave pequeña e inquieta, densamente listada. Propia de terrenos abiertos, es el plato preferido del esmerejón y el huésped ideal para el cuco. Sociable fuera de la época de cría forma grandes bandadas durante la migración.

72. Bisbita alpino

Anthus spinoletta

Ave de aspecto grácil, siempre alarmada, camina con paso rápido y erguida, moviendo continuamente la cola. No es muy sociable, pero puede formar grupos poco numerosos en lugares preferidos de alimentación. Se alimenta principalmente de insectos.

73. Lavandera boyera R3

Motacilla flava

Ave de cuerpo delgado, permanece mucho tiempo posada a baja altura. Su cola larga la mueve constantemente arriba y abajo. Tiene dos hábitat distintos de cría, por un lado prados húmedos y bordes de lagunas, y por otro tierras seca y campos cultivados.

74. Lavandera cascadeña

Motacilla cinerea

Es la más esbelta y con la cola más larga de las lavanderas. Sus patas rosáceas le son características. Por lo general solitaria o en parejas, fuertemente asociada a las orillas acuáticas. El meneo de la cola es más fuerte y vigoroso que el resto de las lavanderas.



75. Lavandera blanca R3

Motacilla alba

Su plumaje gris, negro y blanco es inconfundible. Ave de ciudad como de campo, estrechamente asociada a los hábitats humanos o con las orillas de las lagunas. Menea con frecuencia la cola, especialmente cuando está nerviosa.

76. Ruiseñor común R3

Luscinia megarhynchos

Su canto es inolvidable por su volumen, su variedad de notas y por la fuerza con que es emitido, por lo cual es fácil localizarlo, aunque es extremadamente huidizo. Come insectos del suelo, lombrices, arañas,etc.

77. Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

Ave de carácter muy individualista. Se distingue a simple vista por su coloración negra, la cola rojiza con centro marrón negruzco que agita constantemente y el tono blanquecino variable de las alas plegadas. Vuelos muy cortos y bajos.

78. Colirrojo real

Phoenicurus Phoenicurus

La encendida cola pardo rojiza de esta ave le ha valido su nombre vulgar.
Los Colirrojos Reales saltan repetidamente de rama en rama, o se lanzan cerniéndose en el aire para capturar insectos voladores; suelen recoger alimento del suelo como insectos y sus larvas, arácnidos, etc.

79. Tarabilla norteña

Saxicola rubetra



Es común verlas en matorrales o campos de cultivo construyendo el nido en tierra. Estas aves tienen un vuelo bajo y espasmódico, con rápidos aleteos, yendo de una planta a otra donde se posan, pudiendo lanzarse al aire o coger insectos aunque normalmente comen en el suelo.

80. Tarabilla común R3

Saxicola torquata

Vive en parejas todo el año, cría con preferencia en tierras sin cultivar y pasando a las cultivadas principalmente en invierno, época en la cual su plumaje su vuelve más pardusco y apagado. Se alimentan de insectos, gusanos y arañas.

81.Collalba gris R2

Oenanthe oenanthe

Es un pájaro incansable que se mueve continuamente, tan pronto permanece inmóvil un buen rato como realiza vuelos cortos y rápidos, a menudo a ras del suelo, en persecución de insectos que pasan cerca de su posadero. Se ve fácilmente en terrenos abiertos.

82. Collalba rubia R3

Oenanthe hispanica

Esta collalba se puede distinguir muy bien por el plumaje tan diverso que tiene, al igual que ciertos rasgos del comportamiento relacionados con una mayor confianza y estar más al descubierto. Frecuenta lugares muy variados como matorrales o llanuras esteparias.

83. Mirlo común R2

Turdus merula

En general son aves ariscas que permanecen ocultas. Es un pájaro vivo y agitado. Si se asusta, huye volando raso, lanzando un irritado grito que aumenta gradualmente, aunque su canto es de extremada pureza. Se alimenta de insectos y sus larvas, lombrices, frutos y semillas.

Silviidae - Carriceros, Currucas y Mosquiteros

84. Ruiseñor bastardo R2

Cettia cetti

Ave de costumbres muy escondedizas, lo que hace difícil su observación. Permanece por lo general cerca del suelo entre la vegetación, por donde anda con rapidez y trepa ágilmente. Será su canto el único indicativo de su presencia.

85. Buitrón R2

Cisticola juncidis

Pequeña ave típica de humedales. De carácter huidizo, se hace difícil su observación, suele encontrarse escondida entre la vegetación palustre. El macho realiza un distintivo vuelo rebotante de canto fuerte.

86. Carricero común R3

Acrocephalus scirpaceus

Ave típica de terrenos húmedos. La mayoría del tiempo lo pasa entre los carrizos. Sus patas están perfectamente adaptadas a trepar por los tallos. Continuamente desciende hasta el agua desde la vegetación palustre para picotear insectos.

87. Carricero tordal R3

Acrocephalus arundinaceus

Presenta un tamaño mayor que el carricero común. Se mueve pesadamente entre los carrizos y trepa por sus tallos para cantar en la cima, con un canto sonoro. En los grandes carrizales puede criar en número formando casi colonias.

88. Mosquitero común

Phylloscopus collybita

Ave pequeña y activa, se desplazan por la vegetación rápida y nerviosamente, chasqueando las alas y bajando o alzando la cola notoriamente. Habita por los tarayes presentes en las lagunas.

89. Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus

Fácilmente confundible con el mosquitero común. Se diferencian en el canto y el reclamo. Comparte el mismo hábitat que el común lo que dificulta aún más su identificación. Se alimenta fundamentalmente de frutos e insectos.

Timaliidae - Tordinos

90. Bigotudo R3

Panurus biarmicus

Ave propia de carrizal. Se mueve entre ellos en acrobáticas posturas. Los machos presentan un característico bigote negro. Fuera de la época de cría son gregarios formando pequeños grupos que vagan por los carrizales.

Laniidae - Alcaudones

91. Alcaudón real R3

Lanius meridionalis

Es el mayor de nuestros alcaudones. Se posa en lugares muy expuestos adoptando una postura por lo general encorvada. Su dieta la componen pequeños vertebrados, insectos. Depreda pequeñas aves con más frecuencia que cualquier otro alcaudón.

92. Alcaudón común R3

Lanius senator

El macho presenta la parte superior de la cabeza de color rojizo y frente negra, lo que facilita su identificación. Visible en los campos de cultivo del entorno de las lagunas. Tiene la costumbre de colgar a sus presas en las espinas de las matas.

Corvidae - Cuervos y Urracas

93. Urraca R3

Pica pica

Las Urracas normalmente viven solitarias o en pares, aunque a fin de invierno y principios de primavera pueden verse en cantidades importantes. Gritan, saltan por las ramas y se persiguen unas a otras. Se pueden observar por todo el Complejo Lagunar y anidan en los tarayes.

Sturnidae - Estorninos

94. Estornino negro R3

Sturnus unicolor

Ave común en núcleos urbanos y campos de cultivo. Suele anidar en los tejados de las casas. Se reúnen en pequeños bandos que vagan durante el día por el campo, comiendo en el suelo, y al atardecer acuden a los dormideros.

Passeridae - Gorriones

95. Gorrión común R3

Passer domesticus

Especie que vive más cerca del hombre. Prefiere los campos cultivados pero es muy común en calles, parques y jardines. Suelen formar bandos numerosos. De aspecto pesado, se mueve ágilmente en el suelo. Su alimentación es muy variada dependiendo del hábitat que ocupe.

Fringillidae - Fringílidos



96. Verdecillo R3

Serinus serinus

Pequeña ave que frecuenta también los terrenos baldíos y campos de cultivo en busca de semillas. Emite el canto durante su sinuoso vuelo, y con las alas extendidas y la cola abierta parece una gran mariposa. Ave gregaria fuera de la época de cría.

97. Verderón común R3

Carduelis chloris

Ave bastante grande en esta familia, robusto, verdoso con el cuerpo rechoncho y cola ahorquillada. Su pico es potente pues se alimenta de semillas, a parte de necesitar gran cantidad de materia vegetal. Es frecuente verlo en linderos y zonas despejadas.

98. Jilguero R3

Carduelis carduelis

Se distingue muy bien gracias a su característico rostro y llamativo plumaje. Es un ave muy sociable, cuyo hábitat más común son los campos de cultivo marginales en las lagunas y matorrales. Es granívora e insectívora.

99. Pardillo común R3

Carduelis cannabina

Conocido por su melodioso canto, que emite tanto parado como en vuelo. Son aves gregarias, que forman bandos para comer y nomadean por los campos de cultivo. Se alimentan de semillas herbáces y algunos insectos, especialmente orugas.



Emberizidae - Escribanos

100. Escribano palustre

Emberiza schoeniclus

Llamativo collar blanco que contrasta con la cabeza negra, hacen a los machos inconfundibles. Ave típica de carrizales y zonas húmedas con bastante vegetación acuática. En otoño e invierno se les puede ver formando grandes bandadas con otras especies, alimentándose en los campos de cultivo.

101. Triguero R3

Miliaria calandria

Ave parda de plumaje poco llamativo, propias de terrenos abiertos como campos de cultivo y áreas de pastoreo. Su canto característico y su aspecto pesado son rasgos para su identificación.

Índice

Las 101 especies de aves más frecuentes del Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan

Podicipedidae pag.

1. Zampullín común 9
2. Somormujo lavanco 9
3. Zampullín cuellinegro 9

Ardeidae

4. Garcilla bueyera 9
5. Garza real 10

Ciconiidae

6. Cigüeña blanca 10

Phoenicopteridae

7. Flamenco común 10

Anatidae

8. Ansar común 11
9. Tarro blanco 11
10. Silbón Europeo 11
11. Ánade friso 11
12. Cerceta común 12
13. Ánade azulón o real 12
14. Ánade rabudo 12
15. Cuchara común 13
16. Cerceta pardilla 13
17. Pato colorado 13
18. Porrón europeo 14
19. Malvasía cabeciblanca 14

Accipitridae

20. Milano negro 14
21. Aguilucho lagunero 15
22. Aguilucho pálido 15
23. Aguilucho cenizo 15

Falconidae

24. Cernícalo primilla 16
25. Cernícalo vulgar 16
26. Esmerijón 16
27. Alcotán 17

Phasianidae

28. Perdíz roja 17

Rallidae

29. Gallineta 17
30. Calamón común 17
31. Focha común 18

Recurvirostridae

32. Cigüeñuela 18
33. Avoceta 18

Burhinidae

34. Alcaraván común 18

Charadriidae

35. Chorlitejo chico 19
36. Chorlitejo grande 19
37. Chorlitejo patinegro 19
38. Avefría europea 20

Scolopacidae

39. Correlimos menudo 20
40. Correlimos común 20
41. Combatiente 20
42. Aguja colinegra 21
43. Zarapito real 21
44. Archibebe común 21
45. Archibebe fino 22
46. Andarríos grande 22
47. Andarríos chico 22

Laridae

48. Gaviota reidora 23
49. Gaviota sombría 23

Sternidae

50. Pagaza piconegra 23
51. Fumarel cariblanco 24
52. Fumarel común 24

Columbidae

53. Paloma torcaz 24
54. Tórtola turca 25
55. Tórtola europea 25

Índice

Cuculidae pag.
56. Críalo europeo 25
57. Cuco común 26
Tytonidae
58. Lechuza común 26
Apodidae
59. Vencejo común 26
Meropidae
60. Abejaruco común 26
Coraciidae
61. Carraca 27
Upupidae
62. Abubilla 27
Alaudidae
63. Calandria 27
64. Terrera común 27
65. Cogujada común 28
66. Alondra común 28
Hirundinidae
67. Golondrina común 28
68. Golondrina dáurica 28
69. Avión común 29
Motacillidae
70. Bisbita campestre 29
71. Bisbita común 29
72. Bisbita alpino 29
73. Lavandera boyera 30
74. Lavandera cascadeña 30
75. Lavandera blanca 30
Turdidae
76. Ruiseñor común 31
77. Colirrojo tizón 31
78. Colirrojo real 31
79. Tarabilla norteña 32
80. Tarabilla común 32
81. Collalba gris 32
82. Collalba rubia 32
83. Mirlo común 33
Silviidae
84. Ruiseñor bastardo 33
85. Buitrón 33
86. Carricero común 34
87. Carricero tordal 34
88. Mosquitero común 34
89. Mosquitero musical 34
Timaliidae
90. Bigotudo 35
Laniidae
91. Alcaudón real 35
92. Alcaudón común 35
Corvidae
93. Urraca 36
Sturnidae
94. Estornino negro 36
Passeridae
95. Gorrión común 36
Fringillidae
96. Verdecillo 37
97. Verderón común 37
98. Jilguero 37
99. Pardillo común 38
Emberezidae
100.Escribano palustre 38
101.Triguero 38